

گروه مردمی ماجنا

کمیته آموزش و پژوهش

سالک

علائم بیماری

و پیشگیری از ابتلا



جهت مشاهده بیشتر بروشور های رایگان بر روی سایت زیر کلیک کنید

WWW.MAJNA.IR



# گروه مردمی ماجنا

کمیته آموزش و پژوهش

## سالک

سالک یک بیماری پوستی است که بین انسان و حیوان از جمله جوندگان و سگ سانان مشترک می باشد. هم انسان و هم حیوان را مبتلا مینماید  
عامل بیماری

عامل بیماری سالک ، یک انگل تک یا خته ای تاز کدار به نام لیشمانا می باشد که در بدن میزبان مهره دار از جمله انسان در داخل سلولهای یگانه خوار رشد و تکثیر می یابد. عامل لیشمانيوز جلدی با سالک در اغلب نقاط ایران دیده میشود

## دوره نهفتگی

دوره نهفتگی، یعنی از زمان ورود انگل به بدن تا ظهور علائم بیماری که در نوع مرطوب کوتاهتر از یک تا چهار هفته و در نوع شهری طولانی تر و به طور معمول ۲ تا ۸ ماه میباشد که گاهی ا تاسال طول میکشد

جهت مشاهده بیشتر بروشور های رایگان بر روی سایت زیر کلیک کنید

WWW.MAJNA.IR



# گروه مردمی ماجنا

کمیته آموزش و پژوهش

## علائم بیماری

بیماری غالباً دارای دو شکل بالینی، خشک و مرطوب می‌باشد زخم‌ها بیشتر در قسمت‌های باز بدن . نواحی صورت ، سر، گردن دست و پاهای می‌باشد عموماً پس از گزش توسط پشه آگوده پس از طی دوره نهفتگی علائم بالینی ظاهر می‌شود ابتدا در محل گزش پشه بر آمدگی کوچک قرمز رنگی ظاهر می‌شود که نرم و بدون درد است و در اثر فشار محو نمی‌شود، گاه خارش مختصراً دارد و پس از گذشت چند هفته با چند ماه ضایعه فعال شده بزرگ‌تر و سفت می‌شود در نوع خشک در روی برجستگی فرورفتگی کوچکی به عمق یک میلی متر که نه آن پوسته پوسته است دیده می‌شود رخم حدودی مشخص و حاشیه‌ای نانظم و برجسته دارد که روی آن را دلمه‌ای کثیف و

مهرجویان نیکوکار ایرانیان  
کد ثبت: ۴۹۱

قهوای رنگ می‌پوشاند

جهت مشاهده بیشتر بروشور های **رایگان** بر روی سایت زیر کلیک کنید

WWW.MAJNA.IR



# گروه مردمی ماجنا

## کمیته آموزش و پژوهش

در نوع مرطوب، ضایع به صورت جوش همراه با التهاب حاد می باشد پس از دو هفته وسط ضایعه زخم شده و حاشیه آن پیشرفت می کند و دور آن پر خون میگردد و له زخم نا منظم و دارای چرک زیاد است. نوع مرطوب به نوع روستایی نیز معروف میباشد و در صورت عدم درمان بین چهار تا شش ماه طول می کشد تا بهبود یابد و جوش خوردن زخم از وسط واطراف همزمان اتفاق می افتد. در نوع خشک زخم مرطوب ایجاد نمی شود و طول دوره بیماری معمولا در صورت عدم درمان حدود یکسال میباشد در بیشتر موارد عفونت موضعی باعث تشدید علائم و دواوم بیشتر زخم میشود همیشه پس از بهبود در محل زخم جوشگاه باقی میماند

### مخزن سالک

در شکل مرطوب یعنی نوع روستایی، مخزن بیماری عمدتاً جوندگانی از قبیل موش صحرائی بوده و در شکل خشک یعنی نوع شهری مخزن بیماری انسان بوده ولی سگ و گاهی شغال و روباه هم نقش مخزن را ایفا می کنند

جهت مشاهده بیشتر بروشور های **رایگان** بر روی سایت زیر کلیک کنید



# گروه مردمی ماجنا

کمیته آموزش و پژوهش

روشهای پیش‌گیری از سالک

رعايت بهداشت محیط

گردآوری و دفع بهداشتی و مستمر زباله با استفاده از سطل دردار

گردآوری فضولات حیوانی و جلوگیری از انباشت شدن آن‌ها

بهسازی محیط

ترمیم شکافها و حفره‌های موجود در دیوارها و سایر قسمت‌های مناطق

مسکونی انسان و دام و تخریب و تسطیح اماکن مخربه

دوری از محل زندگی پشه خاکی و مناطق آسوده به سالک به ویژه هنگام

غروب و اوایل شب

محافظت بدن در برابر نیش زدن پشه خاکی

پوشاندن قسمت‌های باز بدن **ویان نیکوکار ایرانیان**

نصب توری فلزی با منافد ریز به در و پنجره‌ها

استفاده از پمادها و مواد دور کننده حشرات به هنگام کار و خواب

محافظت از زخم سالک و پوشاندن آن با گاز استریل

مبارزه با جوندگان و سگهای ولگرد

جهت مشاهده بیشتر بروشورهای **رایگان** بر روی سایت زیر کلیک کنید

[WWW.MAJNA.IR](http://WWW.MAJNA.IR)



# گروه مردمی ماجنا

کمیته آموزش و پژوهش

با اقدام های حفاظتی نظیر نصب توری ظریف به در و پنجره ها و خوابیدن در پشه بند از ابتلا به سالک پیش گیری کنیم  
با دفع صحیح و به موقع زباله و جلوگیری از انباشته شدن آن از ابتلا به سالک پیش گیری کنیم



آیا کسی را میشناسید که به سالک مبتلا شده باشد؟

جهت مشاهده بیشتر بروشور های **رایگان** بر روی سایت زیر کلیک کنید

[WWW.MAJNA.IR](http://WWW.MAJNA.IR)

